Roticlear® na bázi alifatických uhlovodíků

Pro odparafinování histologických řezů. Netoxický alternativní produkt ke xylenu.

CAS: 64742-48-9

- Roticlear® obsahuje různé alifatické uhlovodíky
- Prakticky bez vlastních aromatických složek (max 0,005%)
- Mísitelný s IPA, botanolem, etanolem a acetonem
- Jeho absorpční kapacita parafínu je dokonce lepší než u xylenu, proto se vodní lázně pro absorpci parafínu nemusí tak často vyměňovat
- Roticlear® umožňuje rychlou a efektivní práci díky krátké době vypařování
- Roticlear® poskytuje skvělé výsledky spolu s montovacím médiem Roti®-Mount (R.HP68)

Technické parametry

Hustota:	0,755 g·cm^{-3}
Bezp. věty (GHS):	H226-H304-H336-H412-EUH066



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro histologii	1 l	sklo	R.A538.1
pro histologii	2,5 l	sklo	R.A538.5
pro histologii	5 l	plech	R.A538.6
pro histologii	10 l	plech	R.A538.2
pro histologii	25 l	plech	R.A538.3
pro histologii	200 l	barel	R.A538.4

Alternativní rozpouštědlo pro histologii a cytologii. Náhrada xylenu, toluenu či chloroformu.