Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL

RPMI médium má obecné použití s řadou aplikací pro savčí buňky, především pro leukocyty

- Médium vhodné pro kultivaci normálních a neoplastických lidských leukocytů, B- a T-lymfocytů, stejně jako buněk myelomu a hybridomů
- Médium založeno na bikarbonátovém pufrovacím systému s upravenou koncentrací aminokyselin a vitaminů



RPMI média

Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL s L-glutaminem

Skladovaní při +4 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL s L-glutaminem	500 ml	R.9085.1

Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL s L-glutaminem a HEPES

Skladovaní při +4 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL s L-glutaminem a HEPES	500 ml	R.9086.1

Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL se stabilním L-glutaminem

RPMI se stabilním L-glutaminem umožňuje skladování média při pokojové teplotě

Technické parametry

Teplota skladování:	+4 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL se stabilním L-glutaminem	500 ml	R.9091.1

Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL bez L-glutaminu

Skladovaní při +4 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL bez L-glutaminu	500 ml	R.9099.1

Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL bez L-glutaminu a fenolové červeně

Skladovaní při +4 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium RPMI-1640 ROTI®-CELL bez L-glutaminu a fenolové červeně	500 ml	R.9104.1