Roztok aminokyselin ROTI®-CELL

Roztoky esenciálních a neesenciálních aminokyselin vhodné pro buněčné kultury



50× ROTI®-CELL MEM-AA bez glutaminu

Směs 12 esenciálních aminokyselin ve vodě pro kultivaci většiny eukaryotických buněk

- 50× koncentrovaný sterilní roztok ve vodě vhodný pro buněčné kultury
- Finální koncentrace každé esenciální aminokyseliny odpovídá množství v EMEM (Eagle's Minimum Essential Medium)

Technické parametry

Teplota skladování:	+ 4 °C
pH:	1,2-1,6
Ředění:	1:50 v médiu pro buněčné kultury

Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI®-CELL MEM-AA bez glutaminu, 50x konc.	100 ml	R.0647.1

100× ROTI®-CELL MEM-NEAA

Sterilní roztok 7 neesenciálních aminokyselinami ve vodě pro kultivaci řady buněčných linií

- 100× koncentrovaný sterilní roztok ve vodě vhodný pro buněčné kultury
- Obohacení MEM média o neesenciální aminokyseliny umožňuje kultivaci celé řady buněčných linií, čímž se rozšiřuje použitelnost tohoto média

Technické parametry

Teplota skladování:	+ 4 °C

pH:	3,1-3,7
Ředění:	1:100 pro konečnou koncentraci 0,1 mM každé aminokyseliny

Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI®-CELL MEM-NEAA 100x konc.	100 ml	R.9185.1