

Blotovací membrána ROTI® PVDF

Transferová membrána z PVDF pro přenos biomolekul metodou Western blot

- Hydrofobní mikroporézní polyvinylidenová membrána pro efektivní transfer proteinů o různých molekulových hmotnostech
- Ideální pro western blotting, imuno-blotting, analýzy na pevné fázi a analýzy aminokyselin a proteinů
- Metody detekce: chemiluminiscence, radioaktivní značení a barevná detekce
- Nízký signál na pozadí

Technické parametry

Materiál:	PVDF
Tloušťka membrány:	190±50 µm
Vazebná kapacita:	125 µg/cm²
Typ vazby:	hydrofóbní



Blotovací membrána ROTI® PVDF

Blotovací membrána ROTI® PVDF 0,45

Transferová membrána z PVDF pro přenos biomolekul metodou Western blot s porozitou 0,45 µm

- Optimální pro proteiny ≥20 kDa

Technické parametry

Porozita:	0,45 µm
-----------	---------

Popis	Rozměry (cm)	Balení	Katalogové číslo
Blotovací membrána ROTI® PVDF 0,45	7 × 8,4	10 archů	R.23HE.1
Blotovací membrána ROTI® PVDF 0,45	10 × 10	10 archů	R.23HK.1
Blotovací membrána ROTI® PVDF 0,45	20 × 20	5 archů	R.23HA.1
Blotovací membrána ROTI® PVDF 0,45	300 × 30	1 role	R.200T.1

Membránu je třeba před transferem aktivovat pomocí 100% methanolu.

Blotovací membrána ROTI® PVDF 0,2

Transferová membrána z PVDF pro přenos biomolekul metodou Western blot s porozitou 0,2 µm

- Optimální pro proteiny ≤70 kDa

Technické parametry

Porozita: 0,2 µm

Popis	Rozměry (cm)	Balení	Katalogové číslo
Blotovací membrána ROTI® PVDF 0,2	7 × 8,4	10 archů	R.23HH.1
Blotovací membrána ROTI® PVDF 0,2	9 × 10	10 archů	R.23H9.1
Blotovací membrána ROTI® PVDF 0,2	20 × 20	5 archů	R.23HC.1
Blotovací membrána ROTI® PVDF 0,2	300 × 30	1 role	R.1YYC.1

Membránu je třeba před transferem aktivovat pomocí 100% methanolu.