May-Grünwaldův roztok

Roztok methylenové modři a eosinu v methylalkoholu, pro mikroskopii

- May-Grünwaldův roztok díky své vysoké koncentraci methanolu umožňuje souběžnou fixaci vzorků (doporučená doba residence: 3 minuty)
- Roztok se používá pro diferenciální barvení krevních nátěrů a dalších cytologických materiálů

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H225-H370-H301+H311+H331

MAY-GRÜNWALD ROZTOK

Technické parametry

Hustota:	0,793 g·cm^{-3}

Popis	Čistota	Balení	Katalogové číslo
MAY-GRÜNWALD ROZTOK	pro mikroskopii	1 l	M 11501

May-Grünwaldův roztok může být kombinován s Giemsovým roztokem (R.T862) a používán k vysoce kontrastnímu barvení ("Panoptic staining"; dle Pappenheima)

MAY-GRÜNWALD ROZTOK

Popis	Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
MAY-GRÜNWALD ROZTOK	pro mikroskopii	500 ml	plast	R.T863.1
MAY-GRÜNWALD ROZTOK	pro mikroskopii	1 l	sklo	R.T863.2
MAY-GRÜNWALD ROZTOK	pro mikroskopii	2,5 l	plast	R.T863.3

May-Grünwaldův roztok může být kombinován s Giemsovým roztokem (R.T862) a používán k vysoce kontrastnímu barvení ("Panoptic staining"; dle Pappenheima)



May-Grünwaldův roztok